

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

**Регистрационный номер:** ЛСР-008904/08

**Торговое название препарата:** Лактофильтрум®

**Международное непатентованное название:**

**Лекарственная форма:** таблетки

#### **Состав на одну таблетку:**

Лигнин гидролизный (в пересчете на сухое вещество) - 355 мг

Лактулоза (в пересчете на 100% вещество) - 120 мг

#### **Вспомогательные вещества:**

Натрия кроскармеллоза - 20 мг

Магния стеарат - 5 мг

Целлюлоза микрокристаллическая - до получения таблетки массой 550 мг

**Описание:** Таблетки темно-коричневого цвета с бело-серыми вкраплениями, капсуловидной двояковыпуклой формы с риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** энтеросорбирующее средство.

**Код АТХ:** А07ВС.

#### **Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами входящих в состав активных компонентов - лигнина и лактулозы.

Лигнин гидролизный - природный энтеросорбент, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины, обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. Связывает в кишечнике и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубин, холестерин, гистамин, серотонин, мочевину, иные метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.

Лактулоза - синтетический дисахарид, молекула которого состоит из остатков галактозы и фруктозы. Лактулоза в желудке и верхних отделах кишечника не всасывается и не гидролизуется. Высвобождающаяся из таблеток лактулоза в толстом кишечнике в качестве субстрата ферментируется нормальной микрофлорой кишечника, стимулируя рост бифидобактерий и лактобацилл. В результате гидролиза лактулозы в толстом кишечнике образуются органические кислоты - молочная, уксусная и муравьиная, подавляющие рост патогенных микроорганизмов и уменьшающие вследствие этого продукцию азотсодержащих токсических веществ. Описанный процесс приводит к увеличению осмотического давления в просвете толстого кишечника и стимулированию перистальтики. Комплексное действие препарата направлено на нормализацию микробиоценоза толстого кишечника и снижение интенсивности эндогенных токсических состояний.

Применение препарата в комплексной терапии бактериального вагиноза (дисбиоза влагалища) приводит к повышению эффективности терапии, в том числе увеличению количества лактобацилл во влагалище, а также эффективному подавлению роста условно-патогенной флоры.

#### **Показания к применению:**

Нарушения микрофлоры кишечника (дисбактериоз кишечника), в том числе в результате антибиотикотерапии; в комплексной терапии синдрома раздраженного кишечника, гепатитов и цирроза печени; аллергических заболеваний (атопический дерматит, крапивница), бактериального вагиноза (дисбиоза влагалища).

#### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость препарата, непроходимость кишечника, желудочно-кишечные кровотечения, галактоземия. Нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атонии кишечника.

#### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, при необходимости после предварительного измельчения, запивая водой, за час до еды и приема других лекарственных средств.

*При дисбактериозе кишечника:*

- взрослым и детям старше 12 лет - по 2-3 таблетки 3 раза в день;
- детям от 8 до 12 лет - по 1-2 таблетки 3 раза в день;
- детям от 3 до 7 лет - по 1 таблетке 3 раза в день;
- детям от 1 года до 3 лет - по 1/2 таблетки 3 раза в день.

*При бактериальном вагинозе (дисбиозе влагалища):*

По 2 таблетки 3 раза в день.

Средняя продолжительность курса лечения - 2-3 недели.

Длительное использование препарата и повторные курсы лечения должны проводиться только по рекомендации врача.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата, редко - метеоризм, диарея.

#### **Передозировка**

Симптомы: запор, боли в животе.

Лечение: прекращение приема препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов.

**Особые указания**

Препарат может использоваться в комплексной терапии совместно с другими лекарственными препаратами при соблюдении правила раздельного приема.

**Форма выпуска Таблетки.**

По 10 или 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30 или 60 таблеток во флакон из пластика с навинчиваемой крышкой или в банку полимерную с навинчиваемой крышкой.

По 1, 2, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, 2 или 4 контурных ячейковых упаковки по 15 таблеток или 1 флакон или 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

3 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

**Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек Без рецепта.****Производитель/организация, принимающая претензии:**

ОАО «АВВА РУС», Россия, 610044, г. Киров, ул. Луганская, д. 53 а,  
тел. (8332) 25-12-29, (495) 956-75-54 [www.avva-rus.ru](http://www.avva-rus.ru)

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

Произведено по заказу: ОАО «Фармстандарт»

Россия, 141700, г. Долгопрудный,

Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс: (495) 970-00-30/32 [www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)

